

## Todacitan (venta con receta)

Este medicamento se adquiere con receta y está financiado. El Todacitan (Citisina) ayuda a dejar de fumar y a aliviar la ansiedad que se produce cuando se deja de fumar. El uso de Todacitan permite una reducción gradual de la dependencia a la nicotina y no tiene ninguna influencia sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Todacitan se presenta en comprimidos de 1,5 mg (envase de 100 comprimidos).

### Duración del tratamiento

25 días.

### Posología

Debes dejar de fumar no más tarde del 5to día del inicio del tratamiento. No debes seguir fumando durante el tratamiento porque esto podría empeorar las reacciones adversas.

Del 1er al 3er día de tratamiento, 1 comprimido cada 2 horas, máx. 6 comprimidos/día  
Del 4to al 12º día de tratamiento, 1 comprimido cada 2.5 horas, máx. 5 comprimidos/día  
Del 13º al 16º día de tratamiento, 1 comprimido cada 3 horas, máx. 4 comprimidos/día  
Del 17º al 20º día de tratamiento, 1 comprimido cada 5 horas, máx. 3 comprimidos/día  
Del 21º al 25º día de tratamiento, 1-2 comprimidos al día, Hasta 2 comprimidos

### Recomendaciones

- Debes seguir cuidadosamente las indicaciones de tu médico, ante cualquier duda o posible efecto secundario consulta a tu médico.
- Si olvidaste tomar Todacitan, no tomes una dosis doble para compensar la dosis olvidada, ni una dosis entre horas por si acaso.
- No interrumpas el tratamiento aunque hayan desaparecido las ganas de fumar.
- En caso de tener una recaída, este debe interrumpirse y podrá reanudarse después de 2 o 3 meses.

## Efectos secundarios

La mayor parte de los efectos adversos se producen al principio del tratamiento y desaparecen a lo largo de su duración. Estos síntomas también pueden ser consecuencia de dejar de fumar (síntomas de abstinencia) y no del tratamiento.

Cambios en el apetito (principalmente aumento), aumento de peso, mareos, irritabilidad, cambios de humor, ansiedad, aumento de la presión arterial (hipertensión), sequedad de boca, diarrea, erupción cutánea, agotamiento, trastornos del sueño (insomnio, somnolencia, letargo, sueños anormales, pesadillas), dolores de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca, náusea, alteración del gusto, ardor de estómago, estreñimiento, vómitos, dolor abdominal (especialmente en la parte superior del abdomen), dolor muscular, dificultad para concentrarse, frecuencia cardíaca lenta, distensión abdominal, ardor en la lengua, malestar general.

Poco frecuentes: Sensación de pesadez en la cabeza, disminución de la libido, lagrimeo, disnea, aumento de esputo, salivación excesiva, sudoración, disminución de la elasticidad de la piel, cansancio, aumento de los niveles séricos de transaminasa.

## Contraindicaciones

Alérgia a la citisina (o a: manitol, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, dibehenato de glicerol, hipromelosa), angina inestable, antecedentes de infarto de miocardio reciente, arritmias cardíacas con relevancia clínica, episodios recientes de derrame cerebral, embarazo o período de lactancia.

## Precauciones

Todacitan no está recomendado para su uso en pacientes mayores de 65 años, debe utilizarse con precaución en caso de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, hipertensión, feocromocitoma (tumor de la glándula suprarrenal), aterosclerosis (endurecimiento de las arterias) y otras enfermedades vasculares periféricas, úlcera gástrica y duodenal, enfermedad por reflujo gastroesofágico, hipertiroidismo (tiroides hiperactiva), diabetes, esquizofrenia, insuficiencia renal y hepática.

Deben tomar Todacitan solamente las personas que tengan la firme intención de dejar de fumar. El uso de Todacitan sin dejar de fumar podría provocar el empeoramiento de los efectos adversos de la nicotina.



UTILIZA NUESTROS RECURSOS QUE TE AYUDARÁN EN EL CAMINO DE TU ABSTINENCIA

